

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷一百六十七

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄錄監生臣沈廷棟

欽定四庫全書

普濟方卷一百六十七 明

周王朱橚 撰

痰飲門

痰逆不下食

附論

夫痰逆不下食者由胃膈壅滯津液不通痰水結聚不能消散流行於脾脾性惡濕得水則脹滿心胃不利之痰而逆故令不下食也

方

黃耆散

出聖惠方

治痰止逆和胃思食調利五臟

黃耆

一兩判

半夏

半兩湯浸七次去滑

人參

三分去蘆

頭

桂心

半兩

陳橘皮

三分湯浸去白獮焙

赤茯苓

三分

白朮

三分

甘草

三分

枳殼

三分麩炒

微黃去穢

芎藭

半兩

訶梨勒皮

三分

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓不計時候熱服

枇杷葉散

出聖惠方

治痰逆溫胃口思飲食

青橘皮

半兩湯浸
去白穢焙

草豆蔻

半兩
去皮

前胡

一兩
去蘆

頭

枇杷葉

一兩拭去毛
炙令微黃

半夏

一兩
湯洗

七遍
去滑

人參

三分去
蘆頭

赤茯苓

一兩

大腹皮

半兩

剉

白朮

一兩

厚朴

一兩去麤皮塗生
薑汁炙令香熟

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓不計時候熱服

丁香散

出聖
惠方

治痰積心胃氣噎嘔逆飲不下

丁香

一兩

陳橘皮

一兩湯浸
去白穢焙

赤茯苓

一兩

半夏

半兩湯洗
七通去滑

人參

三分去
蘆頭

雞蘓 三
分

麥門冬

三分
去心

甘草

一分炙
微赤判

右為散每服四錢以水一中盞加薑半分煎至六分

去滓不拘時溫服

木瓜散

出聖
惠方

治痰逆不思飲食化涎益脾胃

乾木瓜

一兩

高良薑

半兩
判

陳橘皮

半兩湯浸
去白穰焙

桂心

半兩

訶梨勒皮

半兩

沉香

半兩

厚朴

半兩
去麩

皮塗生薑汁
炙令香熟

甘草

一分炙
微赤判

半夏

半兩湯洗
七通去滑

右為散每服三錢以水一中盞入生薑半分棗二枚煎六分不計時候熱服

療心胃中痰積氣噎嘔逆食不下

柴胡

六分

橘皮

六分

茯苓

十分

人參

八分

麥門冬

八分
去心

雞蘆

八分

生薑

四分

檳榔仁

四分

末湯
成下

右切以水八升煮取二升五合瀝去滓分溫三服時相去如人行七八里進一服未瘥三日更服一劑以

利為度忌酢物生冷油膩粘食

檳榔散

出聖惠方

治胃中痰壅嘔逆不納飲食四肢少力

腹內小鳴

檳榔

三分

半夏

一兩湯洗七遍去滑

赤茯苓

一兩

白朮

二兩

青橘皮

半兩去白穢湯浸焙

草豆蔻

半兩

皮去

前胡

一兩去蘆頭

杏仁

二分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六分去滓不計時候溫服

治痰逆不能下食調和胃膈宜服此方

出聖
患方

前胡

一兩去
蘆頭

半夏

半兩湯洗
七通去滑

木香

三分

赤茯苓

三分

白朮

一兩

陳橘皮

半兩湯洗
去白穢焙

厚朴

三分去麤皮塗
生薑汁令香熟

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎七分去

滓不計時候溫服

治痰逆暖胃口思飲食宜服此方

出聖
患方

白礬

一兩
燒灰

半夏

半兩湯浸
七通去滑

乾薑

半兩
炮裂

劉

右為末以生薑汁煮麴糊為丸如桐子大每服不計時候以薑棗湯下二十九

木香丸

一名消痰丸
出聖惠方

治痰逆暖脾胃令思飲食

方見
本門

痰癖
類

三聖散

出儒門
事親

防風

三兩
去蘆

藜蘆

去苗心加減用之或
一兩或半兩或八分

瓜蒂

三兩
揀淨

研碎以紙捲定連紙判細去紙用粗羅羅過
另放末將渣炒微黃次入末一處同炒黃用

右為麤末每服約半兩以薑汁三茶盞用二盞煎三五沸去薑汁另入一盞煎至三沸却將原二盞一處

熬沸去渣澄清放溫徐徐下之不必盡劑以吐為度

半夏碁子

出十使良方

治久疾溫冷不下食嘔吐不止停

飲在胃中

右以半夏五兩洗搗羅為末取二錢以白麪一兩水和搜切如碁子水煮麪熟為度生薑醋調和食之

稀涎散

出儒門事親

豬牙皂角

不虫蛀者去皮
弦秤一兩炙用

碌礬二兩

晉礬半兩

藜蘆

半兩

右為末每服半錢或一二錢幹開牙關漿調下灌之

治痰壅嘔吐逆心胃滿悶不下飲食

出本草

用厚朴一兩塗生薑汁炙令黃為末非時粥飲調下

二錢匕

療胃中多痰頭痛不飲食

出本草

右用礬石一兩以水二升煮取一升內蜜半合頓服

須臾吐出涎痰如未吐當飲少熱湯即吐一方治痰涎用白礬

痰飲食不消

附論

療源夫痰水者結聚在於胃腑膀胱之間久而不散流行於脾胃惡濕得水則脹脹則不能消食也或令腹裏虛滿或水谷不消化或嘔逆皆其候也

方

御愛紫宸湯

出德生堂

解宿酒嘔噦惡心睡不進飲食

良薑

二兩

丁香

二兩

甘草

二兩

陳皮

二兩

藿香

一兩

官桂

一兩

茯苓

一兩

檀香

一兩

木香

半兩

砂仁

一兩

葛花

一兩

乾葛

一兩

右咬咀每服四錢水一盞半煎至八分去滓不拘時

候服

高良薑散

出聖惠方

治痰飲破冷氣化宿食

高良薑

三分

肉桂

一兩去皴皮

厚朴

一兩去麤皮塗生薑汁製

白朮

一兩

陳橘皮

三分湯浸去白穢焙

木香

三分

赤茯苓

兩一

訶梨勒皮

兩一

大腹皮

三分

人參

去蘆 兩一

頭

草豆蔻

半兩 去皮

甘草

半兩 炙 微赤 剉

右為散每服五錢水一盞入生薑半分煎至五分去

滓不拘時候溫服

白朮散

出聖 惠方

治氣膈痰飲兩肋下痛食不消化

白朮

兩一

柴胡

兩一 去苗

赤芍藥

三分

檳榔

兩一

陳橘皮

三分 湯浸 去白 糠焙

厚朴

兩一 去麤皮 塗生 薑汁 炙令 香熟

桔梗

兩一 去 蘆頭

訶梨勒皮

三分 桂心 兩半

甘草

一分 炙 微

赤判

右為散末每服五錢以水一盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

枳實散

出聖惠方

治胃中痰飲冷熱不調食不消化體重

多卧

枳實

二兩麤炒微黃

附子

一兩炮裂去皮臍

紫蘇莖葉

三分

白朮

一兩

人參

三分去蘆頭

川大黃

三分

判炒碎微

大腹皮

三分判

麥門冬

三分去心

半夏

三分湯浸

七次
去滑

甘草 一分炙
吳茱萸 一分湯浸七遍焙乾微炒

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不拘時候溫服

訶梨勒皮丸

出聖惠方

治痰飲心胃積滯氣不宣通飲食

不消

訶梨勒皮

一兩

神麴

三分炒微黃

前胡

一兩去蘆頭

枳殼

三分炒

散黃去穢

桂心

一兩

白朮

一兩

人參

三分去蘆

頭

檳榔

一兩

木香

一兩

川大黃

一兩

判碎
微炒

右為末煉蜜和九搗三二百杵丸如梧桐子大每服
不計時候以生薑橘皮湯下三十九

前胡丸

出聖惠方

療心頭痰積宿食水嘔逆不下食

前胡

五分

白朮

五分

甘草

五分

旋覆花

三分

豆蔻仁

三分

人參

六分

麥門冬

六分

枳實

四分

大黃

四分

右搗篩蜜和為丸如梧桐子大空心酒下二十九漸

加至三十九日再服不甚利忌桃李雀肉海藻松菜
熱麪炙肉魚蒜粘食生冷等物或用生薑荊芥湯下

亦可

前胡散

出聖惠方

治脾胃虛冷痰飲結聚飲食不消

前胡

一兩去蘆頭

丁香

三分

陳橘皮

一兩湯浸去白穰焙

大腹皮

一兩剉

枇杷葉

三分拭去毛炙微黃

草豆蔻

一兩

煨去皮

半夏

三分湯洗七遍去滑

甘草

半兩炙微

赤剉

乾薑

半兩炮製剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不拘時候溫服

半夏散

出聖惠方

治痰飲積聚食不化

半夏

一兩湯浸七次去滑

赤茯苓

一兩

訶梨勒皮

一兩

紫蘇莖葉

一兩

陳橘皮

一兩湯浸去白穢

附子

一兩炮裂去皮臍

枳實

半兩麩炒微黃

皂角

一挺去皮

塗酥炙令焦黃去子

甘草

半兩炙微赤剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎五分

去滓不計時服

人參散

出聖惠方

治胃中積聚痰飲時有嘔逆胃氣不和

食不消化

人參

一兩去蘆頭

半夏

一兩湯洗七遍去滑

陳橘皮

一兩

湯洗去

白糝焙

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五分去滓不計時候溫服

療胃膈痰飲食噉經時則併吐出血皆不消其人初空

腹一兩日驟食還服吐之極不便此由痰飲聚下絕不通服此九宣通下氣

吳茱萸

二兩

白朮

二兩

澤瀉

二兩

芍藥

二兩

漢防已

二兩

赤茯苓

二兩

川大黃

二兩

右搗篩蜜和丸如梧桐子大每服二十五丸忌桃李仁雀肉酢物

治胃多有痰頭痛不欲食及飲酒瘀阻作癰方

肘後方

右用桂四兩甘草二兩附子一枚炮水六升煮取二升分

為三服暖胃

暖胃除痰進食消食方

護命方

木香

一分

肉豆蔻

二箇 去皮

半夏

半兩 去臍孔 薑汁浸熱令黃色為末

右為末以蒸餅丸如芥子大酒食後以津液下五九

至十九

赤茯苓散 治痰飲乾嘔食不消化及脾胃胃膈

方見本門

留飲類一名

赤茯苓湯

治痰飲飲食不消化乾嘔

人參

兩一

旋覆花

兩一

橘皮

兩一

細辛

兩一

澤瀉

兩二

白朮

兩二

杏仁

兩二

枳實

兩二

茯苓

兩三

柴胡

兩三

生薑

兩三

半夏

兩三

芍藥

兩三

右咬咀以水九升煮取二升七合分三服日三

驅痰飲子

治痰飲神効如人頭痛背痛飲食嘔惡皆

痰飲之證

天南星

片一兩切作十湯浸七次

半夏

洗一兩七次湯

青皮

去白一兩

陳皮

一兩
去白

赤茯苓

草藁子

去殼
切碎

右六味咬咀每服二錢水一鍾生薑七片棗子一枚煎七分通口服不拘時候如飲酒先服一服酒後再一服或以次日夜醒又一服永無痰飲

膈痰結寔

附論

夫膈痰者氣不降津液痞澀水飲之氣聚於膈上久而隔食故令氣道奔迫痞滿短氣不能卧甚者頭目旋暈常欲嘔吐是也

聖惠方論云夫痰結實者由痰水積聚於胃脘間冷氣相搏結實不消故令心

腹痞滿氣息不利頭眩目暗
常欲嘔逆故言痞結實也

方

百合湯 治痰飲上焦有熱壅塞不利

百合

兩半

枳殼

兩半 去穢炒

麻黃

兩半 去根節

天雄

兩半 炮去

皮

欬冬花

兩半

昆布

兩半 洗去鹹

貝母

兩半 去心

當歸

兩 切焙

五味子

兩

紫苑

兩 去苗土

白石脂

兩

黃連

兩 去鬚

黃芩

兩半 去黑心

桂

兩半 去麋皮

旋覆花

兩

焙

右為咬咀如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑三片同煎至八分去滓溫服

此胡地骨皮湯 治膈痰結實氣不升降

此胡

去苗

地骨皮

赤茯苓

去黑皮

芳窮

大黃

葛根

剉

芍藥

茵陳蒿

甘草

當歸

切焙

升麻

各等分如心燥加麥門冬一兩

右搗篩每服三錢水一盞半食後臨卧服去滓

金箔丸 治膈痰結實咽喉不利欬嗽喘急

龍腦

研半兩

珍珠

研末半兩

金箔

片十五研

牛黃

研半兩

麝香

研半兩

馬牙硝

研半兩

蓬砂

研半兩

丹砂

研一兩

甘草末

二兩

右合研令勻煉蜜和丸如鷄頭大每服一九食後溫
薄荷湯或人參湯嚼下

前胡散 治胃中宿食痰結食飲減少或發寒熱臥欲

起

前胡

一兩去蘆頭

旋覆花

半兩

桂心

半兩

人參

一兩去蘆

頭

川大黃

一兩到
碎微炒

甘草

半兩
炙微

赤劉

半夏

一兩湯浸
七遍去滑

檳榔

一兩

杏仁

半兩湯浸去皮尖
雙仁麩炒微黃

右為散每服五錢水一大盞入生薑半分煎五分去

滓不計時溫服

八珍九

治膈痰結實胃不利喘嗽嘔逆

丹砂

半兩
研

犀角

二錢
鎔

羚羊角

二錢
鎔

牛黃

二錢
研

茯神

二錢去
木搗末

龍腦

二錢

天南星

一錢牛膽
內製陰乾

蓬砂一錢
研

右合研令勻煉蜜和九如鷄頭實大每服一九食後
人參荊芥湯嚙下

丹砂丸 治膈痰結實頭旋惡心肢節疼痛

丹砂半兩
研

半夏一兩
七遍焙

天南星一兩

炮

蝎梢一兩
炒

白附子一兩
炮

白僵蠶一兩

炒

蓬砂一錢
研

牛黃一錢
研

右為末合研令勻麪糊和九如梧桐子大每服五七

九食後荊芥湯下

銀粉丸 治膈痰結實滿悶喘逆

粉霜

半兩

鉛白霜

半兩

白礬

半兩 熱
令汁枯

水銀

半兩

鉛

半兩 與水
銀結炒

天南星

一兩
半炮

半夏

一兩 湯洗
七遍去滑

丹砂

一兩
研

右各研為末合研令勻麩糊和丸如梧桐子大每服
三九食後薄荷湯下小兒九如麻子大

犀角湯 治膈痰結實頭目昏暈不思飲食

犀角

一分
鎊

人參

一分

黃芩

一分
去黑心

訛胡

一分
去苗

甘草

半分
炙

白茯苓

半兩
去黑皮

麥門冬

半兩

去心
焙

升麻

半兩

右細剉每服半兩水二盞煎至八分去滓食後服

木香丸

一名香
摘丸

治膈痰結實胃膈不利頭目昏眩不

思飲食

木香

一分

牽牛子

一兩
炒

半夏

一兩
湯洗七次焙

白礬

一兩
熟
今汁括

攢榔

半兩

青橘皮

半兩
湯浸去
白入鹽炒

右為細末煮棗肉和丸如梧桐子大每服二三十丸
食後生薑湯下

治痰膈食心胃壅滯常欲嘔逆不能下食宜服此藥

出聖

患方

半夏

一兩湯浸
七遍去滑

郁李仁

一兩湯浸
去皮微炒

旋覆花

半兩

前胡

一兩去
蘆頭

桔梗

半兩去
蘆頭

枳殼

半兩
麩炒

微黃
去穢

右為散每服三錢以水一大盞入生薑半分煎至六

分去滓不拘時候溫服

四味半夏丸 治痰膈結實寬利胃膈

半夏

四兩
生用

白礬

三兩
生用

粉霜

半兩
研

牽牛子

三兩

生搗
取粉

右各搗研為末合研令勻生薑自然汁煮麴糊為丸如梧桐子大以丹砂為衣每服七丸至十九食後臨睡溫水下

龍腦丸 治膈痰結實咽喉不利

龍腦

三錢
研

丹砂

一兩
研

白礬

半兩
熬令汁枯

半夏

三兩
湯洗

七次去滑
陰乾為末

右各研令勻生薑自然汁煮麴糊和丸如豌豆大每

服十五丸食後臨卧溫水下

半夏丸

出聖
惠方

治痰隔食不消見食欲嘔

半夏

二兩
湯洗七次去滑

乾薑

一兩
炮裂判

白礬

一兩
燒令

汁
盞

草豆蔻

一兩
去皮

右為末生薑汁煮麴糊為丸如梧桐子大每服不計

時候以薑棗湯下十九日三服

吐痰九

一名捺
腸散

治痰實寒熱發渴心胃滿悶

方見本
門痰飲

類

半夏九

出十使
良方

治膈痰結實胃中痞悶欬喘急

半夏

五錢湯洗
七次焙

生薑

五錢
切焙

皂角

五枚
去皮

子搥碎水
一升煮焙

右為末入生薑汁煉蜜和丸如桐子大每服二十九
食後泡皂角子湯下

治痰實胃中結聚不散此方

一名半夏湯
出聖惠方

半夏

五兩

皂角

五挺
槌碎去皮

右同大鼎子內用水煮一日去皂角取半夏曬乾搗細羅為散每服一錢以水一中盞入生薑半分葱白七寸煎至六分去滓不拘時候溫服

五膈丸

出肘
後方

膈中之病名曰膏肓湯丸徑過針灸不

及所以作丸含之令氣勢得相惠染此疾有十許方率皆相類此丸最勝他方用藥雖多不合五膈之名謂憂

膈氣患膈寒膈其病各有診別在大方中又有七氣方大抵於此大同小別耳

右以麥門冬十分去心甘草十分炙椒遠志附子炮乾薑人參桂細辛各六分搗篩以上好蜜為丸如彈子大以一九含稍嚥其汁日三九服之治短氣心胃滿悶心下堅冷氣也

又方

出聖惠方

治痰實胃中結聚不散

皂角

三十挺不蛀者去黑皮搥碎

右以水五升浸一宿揉取汁去滓於鍋內微火熬令
可九即九如桐子大每於食後以鹽漿水下十九

又方

出聖
惠方

密陀僧

一兩

右用醋一盞水一中盞煎令醋水俱盡候乾細研為
散每服一錢以水二小盞煎至一盞不計時候和滓
溫服如人行一二里當吐出痰涎為効

鶴頂丹 治大人小兒風壅痰寔咽膈不利口乾煩渴

睡卧不安及中暑頭痛燥渴不解

麝香

二兩
半研

寒水石

一百一
十兩粉

硃砂

一百
兩研

飛

牙硝

一百二十
五兩枯研

甘草

三十
五兩

炒為
末

右合研勻煉蜜搜和每一兩二錢作十九大人溫生
薑水化下一九如治中暑入生龍腦少許同研細辛
水化下小兒一九分四服更量大小加減又治小兒
臟腑積熱神不寧夜卧狂呌口舌生瘡用薄荷自然

汁化下並食後服

治氣不順停痰上攻頭痛

出澼
察方

二陳湯

氣實脉盛
者溫膽湯

加沉香

木香

天南星

生各
少許

右加薑五片煎熱服

治一切痰實上膈不利大便秘熱

出復
命方

皂角

半兩去皮
以酥炙

旋覆花

一兩

大黃

一兩

杏仁

一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大食後熱水下二十九

丁香半夏湯

出楊氏家藏方

平胃益氣寬膈化痰治嘔逆惡

心

半夏麴

二兩炒黃

白朮

二兩

人參

二兩去蘆頭

甘草

一兩微炙

白檀香

一兩

生薑

一兩去皮切片焙

薑黃

半兩

丁香

半兩

右件為細末每服二錢沸湯點下

逍遙丸

出御藥院方

治膈實氣痞痰實喘促

半夏

二兩湯洗
七次焙

枳實

一兩
麩炒

檳榔

一兩

赤茯苓

一兩
去皮

右件四味為細末薑汁糊為丸如豌豆大每服二三
十丸食後生薑湯下

利膈解痰實

出本
草

以前胡用薑汁漬搗服之

開胃膈痰實結氣不并下焦冷氣不能下食

出本
草

以乾橘皮一斤搗為末蜜為丸每食前酒下三十九

治痰飲上膈熱

出本
草

取離鬲草生絞汁服一合當吐出胃膈間宿物

下膈踈痰止吐

出本
草

以濟水服之

濟水出
東阿

治膈痰吞酸

出本
草

以皂角炮核取中黃心嚼餌下

熱痰

附論

夫熱痰者由氣道壅塞津液不通或飲漿水結聚而陰

陽痞隔上焦生熱熱氣與痰水相搏聚而不散也若身體虛熱逆害飲食咽喉乾燥或塞或壅頭目昏重欬唾稠濁面目熱赤是其證也

方

鵝梨煎九 治熱痰涼心肺利胃膈解熱毒補元益氣

大鵝梨

二十枚去皮核用淨布絞取汁

皂莢

不蛀十枚去黑皮用漿水二升揉取

汁濃

生地黃

半斤研淨布絞取汁

生薄荷

半斤

研取汁

蜜

半斤已上五味同於銀石器中慢火熬成膏入諸藥

人參

三兩

白茯苓

三兩 去黑皮

白茯苓

三兩

牛膝

三兩 酒浸一宿切焙

肉蓯蓉

三兩 酒浸一宿切焙

羌活

三兩 去蘆焙

山芋

三兩

檳榔

二兩 煨判

半夏

一兩 湯浸

七次
焙乾

甘草

半兩 炙判

木香

一兩

防風

一兩 去叉

白朮

一兩

桔梗

一兩 炒

青橘皮

一兩 去白焙

右除五味為膏外餘搗羅為末入膏拌和杵令硬輒

得所九如梧桐子大每服十五九至二十九荆芥湯

下食後服日三服

麝香丹砂丸 治痰咽胸膈不利頭目昏痛

麝香

一分
研

丹砂

一兩
研

麥門冬

三分
心焙

龍腦

一錢
研

木香

半兩

丁香

半兩

犀角

半兩
末

甘草

半兩

人參

半兩

藿香

半兩
去梗

天南星

半兩

牛膽
製者

防風

半兩
去叉

黃耆

半兩
剉

右為末拌勻煉蜜和丸如雞頭實大每服一九嚼破
以荊芥湯下候臨卧服

木蘭湯 主熱痰飲氣兩肋滿悶不能食者

木蘭

分三

枳實

分三

黃芩

分三

白朮

分三

漏蘆根

雨四

白薇

雨四

升麻

雨四

芍藥

雨四

桔梗

雨四

生薑

雨四

大黃

雨四

右以水八升煮取二升六合分三服如人行三四里
進一服忌桃李豬肉一方有玄參二兩

旋復花散

出聖
惠方

治心胃痰熱頭目旋痛飲食不下

旋復花

雨半

石膏

二雨細
研入

枳殼

二雨麤炒
微黃去穢

赤茯苓

雨一

人參

一雨去
蘆頭

麥門冬

一雨
去心

黃芩

分三

柴胡

一兩
去苗

犀角屑

三分

甘草

半兩
炙
微赤判

防風

三分
去蘆

頭

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓食後良久溫服

枳殼丸

出聖
惠方

治痰熱心膈煩滿頭痛目旋暈不納食

枳殼

三分
麩炒
微黃去核

石膏

三兩
細
研水飛

牛旁子

半兩

微炒

前胡

一兩
去
蘆頭

川大黃

三分
判
碎微炒

甘草

半兩
炙
微赤判

半夏

一兩
湯洗
七次去滑

防風

半兩
去蘆

羚羊角屑

三分

杏仁

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為末煉蜜為丸搗三二百杵丸如梧桐子大每於食後良久煎竹葉湯下三十九

茅根散

出聖惠方

治心肺壅熱胃膈煩悶痰逆不能下食

茅根

二兩剉

子芩

一兩

枇杷葉

三片拭去毛炙微黃

赤茯苓

一兩

陳橘皮

半兩湯浸去白穰

甘草

半兩炙微

赤剉

麥門冬

一兩去心

雞蘇

一兩

人參

半兩去蘆

半夏

半兩湯洗七遍去滑

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分竹葉二十

七片煎至五分去滓食後良久溫服

犀角散

出聖惠方

治上焦壅滯痰熱心煩不欲食

犀角屑

三分

前胡

一兩去蘆頭

麥門冬

一兩去心

川升麻

三分

黃耆

三分剉

半夏

三分湯洗七遍去滑

甘草

半兩生

桑白皮

三分剉

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓食後良久溫服

參黃湯 治熱痰導壅氣潤腸胃

大黃

三兩
煨剉

人參

二兩

枳殼

二兩湯浸
去穢麤炒

檳榔

二兩
煨剉

焰硝

一兩
研

半夏

一兩半湯浸
去滑炒黃

甘草

半兩
炙剉

黃芩

三分去
黑心

右麤搗篩每服二錢以水一大盞入生薑半分同煎

至七分去滓食後臨卧溫服

麥門冬散

出聖
惠方

治熱痰胃膈壅滯口乾煩渴不思飲

食

麥門冬

一兩
去心

枇杷葉

三分
拭去
毛炙微黃

石膏

一兩

川升麻

三分

子芩

三分

甘草

一分
炙
微赤剉

赤茯苓

三分

枳殼

三分
麩炒
微黃去穰

右為散每服五錢以水一大盞入竹葉二十片生薑

半分煎至五分去滓食後良久服

治上焦痰熱頭目旋暈心神煩躁不下飲食宜服此方

出聖

惠方

犀角屑

三分

苦參

一兩
搗

旋覆花

半兩

前胡

一兩
去蘆

頭

麥門冬

一兩 去心

甘草

一兩 炙 微赤 剉

枇杷葉

半兩

拭去毛 炙微黃

枳殼

三分 麩炒 微黃 去穰

右為末每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於

食後良久溫服

白雪丸

出御藥院方

治痰實胸膈嘈逆及頭目昏眩困倦

心腹脹滿

白附子

二兩 生

天南星

二兩 炮

半夏

二兩 洗炒

滑石

三錢 半研

石膏

三錢 半研

龍腦

三錢 半

麝香

三錢 半

右為末稀麪糊為丸如菴豆大每服三十九薑臘茶
或薄荷茶下每遇頭目昏困精神憊冒胃中痰逆憤
憤如中酒則服此藥良久間如塞去重障豁然清爽
頓覺夷暢食後服為佳

麥門冬湯 治胃間熱痰不思食

麥門冬

一兩去心焙

葛根

一兩

人參

一兩

前胡

一兩去蘆頭

犀角

一兩鎊

桔梗

半兩

蘆根

一兩

右剉如麻豆大令勻每服五錢水一盞半煎至八分

去滓酒服

柴胡飲子

出經
驗良方

治痰熱頭疼手足煩熱榮衛不調肢

節倦怠身體疼痛嗜卧少力飲食無味兼治五飲消痰癖利膈除煩悶

柴胡

八兩

半夏

二兩
湯洗

白朮

二兩

人參

三兩

甘草

三兩

黃芩

三兩
炒

麥門冬

三兩
去心

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半入生薑五片棗一枚同煎八分去滓溫服不拘時候

犀角九 治熱痰噎悶乾嘔頭目疼昏如醉

犀角

半兩
鎊

半夏

二兩
漿水
煮透

天南星

二兩
黃牛膽
內浸三宿
焙

丹砂

半兩
研

白礬

半兩
熬
令汁枯

人參

半兩

大黃

半兩
用醋

煮一時
火焙乾
秤

右為末用大肥皂角十五挺揉水二碗慢火熬成膏
入前藥為丸如梧桐子大每服二十九食後生薑薄
荷湯下

化涎散 治熱痰利胃膈止煩渴

凝水石

一兩 炭火煨

鉛白霜

一兩

馬牙硝

一錢

雄黃

一錢 研

白礬

一兩 熬令汁枯

甘草

一兩 微炒

右搗研為末散別入龍腦少許更研勻每服一錢蜜水調下小兒風熱涎用砂糖水調下半錢此藥大涼不得多服

丹砂銀箔九

治苦痰寧神志去頭痛惡心解煩躁

丹砂

三分 細研水飛

天南星

一分 膽製

雄黃

一分 研

龍腦

一分

銀箔

五片

馬牙

一錢 研

右各研細再同研令勻煉蜜和丸如雞頭實大每服
一九嚼破煎人參湯冷下或竹葉湯新水下亦得食
後臨卧服

天南星丸

治熱實結搏咽嗑不利咳嗽久不愈

方見咳嗽

門痰嗽類一
名大白丹

一方

治熱痰煩悶頭暈眼花四肢悶亂

甘遂

硃砂

風化朴硝

大戟

白芥子

黑芥子

右等分如前每服二十九薑湯下

千金散 治苦痰壅盛咽隔不利

半夏

半兩用生薑一兩同搗爛作餅子曝乾

滑石

三兩末

凝水石

三分

煨

甘草

五錢

青蛤粉

五錢末

右同研如粉每服一錢薑汁一盞煎至六分臨卧溫

服

松蘿湯 治胃中痰癖積苦皆除之

松蘿

三兩

梔子

十四枚

烏梅

十四枚

甘草

三兩

恒山

三兩

右為咬咀以酒三升浸一宿平旦以水三升煮取一升半去滓頓服之亦可分二服一服得快吐即止忌海藻松菜生葱等

枳殼半夏湯

治除苦痰下氣寬中利膈清上焦治痞滿

枳殼

一兩

半夏

一兩

黃芩

一兩

桔梗

一兩

甘草

五錢

右剉為散每服四錢生薑三片桑白皮十寸烏梅一

箇煎服未効加甜葶馬兜鈴防已薄荷立効吐熱痰黃色是也

龍腦九 治解暴熱化痰涼膈清頭目

草龍腦

四兩

白礬

四兩燒沸定

天南星

二兩

半夏

二兩水浸

切作片用漿水雪水鍾半同煮三五沸焙乾秤

右為細末麪糊為丸如梧桐子大每服三十九臘茶清下食後臨卧服麪糊須極稀如濃漿可也熱痰壅膈若頭目眩重服之頓清嶺南瘴毒繞覺意思昏悶

速服便瘥咽喉腫疼口舌生瘡凡上壅苦痰諸證悉
可服小兒尤良

龍腦丸 治熱痰咽乾煩渴

龍腦一字

鉛白霜

一分研

甘草

半兩炙剉

凝水石

一分

用火燒令
通赤研

右味搗羅細研令勻用炊餅為丸如梧桐子大每服
含化三九至五九

丹砂丸 治熱痰壅盛虛煩燥渴

丹砂

一兩研
水飛

天南星

一兩
炮

白礬

一兩熬
令汁枯

莽草

半兩
炙

右搗研為末，更用半夏二兩湯洗七次，曝乾為末，水煮作糊，和前藥為丸，如梧桐子大，每服七丸至十九丸，薄荷茶或生薑湯溫水下，不拘時候。

烏龍丸

治熱痰壅滯，咯唾如羊脂，利咽膈，墜痰涎。

皂角

一兩不蛀者
燒存性為末

白礬

好者半
生半枯

鉛白霜

一兩

研

朴硝

一兩
研

右合研勻，醋煮麩糊為丸，如梧桐子大，每服十九丸，濃

煮槐實湯下咽喉腫痛上膈不利以甘草煎湯食後
臨卧服

金硃化痰丸 治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚

胃膈煩悶涕唾稠粘欬嗽咽膈不利

皂莢仁

四兩炒

天竺黃

四兩

白礬

明者枯過四兩

半夏

四兩湯洗

七次薑二兩去皮同搗作小餅炙微黃

白龍腦

半兩生研

辰砂

二兩研飛

金箔

二十片為衣

右以半夏皂角子為末與諸藥同拌勻生薑汁煮麩

糊為丸如梧桐子大每服十九至十五丸生薑湯食
後臨卧服

小黃丸 治熱痰咳嗽其脉洪而面赤煩苦心痛唇口
乾燥多喜笑

南星

一兩湯
浸七遍

半夏

一兩
湯洗

黃芩

一兩

右為細末生薑汁浸蒸餅為丸如梧桐子大每服五
七十九薑湯下食後

礬石丸 治熱痰壅滯

白礬

一兩熟
今汁枯

丹砂

半兩研
水飛

右研勻薄麪糊和丸如梧桐子大爛嚼棗乾嚥下五

丸不計時候

法治紅半夏

出醫方
集成

治風痰止咳嗽清頭目利咽膈

消痰降氣

每用半夏一兩加龍腦半錢研極細放在半夏上又
用水飛研硃砂半兩再為衣先鋪長燈草一重約厚
一指攤半夏在燈草上又用燈草蓋約厚一指以煮

豆焙之候乾取出於器內收貯每服一兩粒細嚼食
後溫水或冷水下半夏仍依痰疾飲類製半夏法

人參散

出本
事方

治邪熱於經絡肌熱痰嗽五內煩躁頭

目昏痛夜多盜汗此藥補和真氣解勞倦婦人血熱
虛勞骨蒸並皆宜服

人參

一兩

白朮

一兩

白茯苓

一兩

柴胡

一兩

半夏

一兩

當歸

一兩

赤芍藥

一兩

乾葛

一兩

甘草

一兩

子芩

半兩

右為細末每服三錢水一盞生薑四片棗二枚煎至八分不拘時候帶熱服但是有勞熱證皆可服熱退即止大抵透肌解熱乾葛第一柴胡次之所以升麻葛根湯為解肌之冠也

雙玉散

出保生集門方

治痰熱而喘痰湧如泉

寒水石

石膏

各等分

右為細末煎人參湯下三錢食後服

解熱毒治痰壅

出本草

以砒霜生不和石色赤甚如雄黃者以冷水磨服甚効

去熱解痰

出本草

以茗藜煮汁同煮粥食之良

治風熱痰盛

用老茄子黃大者不計多少以甕瓶盛貯於中經一年盡化為水取出入苦參末同丸如梧桐子大每服食已及欲卧時酒下三十九其功甚効

又方

用蘿蔔子為末溫水調一匙頭嚥下良久出涎沫如
是癰緩風以此吐後用緊疎藥服疎服和氣瓶散即
瘥

寒痰

附論

氣為陰陽不足者不能銷禁水飲遇脾氣虛寒熱氣逆
痞膈則聚飲而成痰浸漬腸胃上為嘔逆吞酸下為洞
泄寒中久不已則令人消瘦倚息短氣妨害飲食昔人

治痰飲多以溫服和之正為此也難經曰肺大過則外證面白善噦悲愁不樂欲泣其內外證喘嗽上喝逆氣煩心胃滿煩熱夜則涕出多噦悲愁鼻不通肺金脉大名以子助母也心脾肝皆受寒邪涎出水反傷土寒寡於畏也腑中大寒病名曰寒中痰白作泡肺中氣虛而為水助母也當於肺中瀉腎中浮火辛熱之藥不能退也口中痰沫胃中寒而不和以辛甘熱去之飲酒多有此證也

方

草豆蔻散

出聖惠方

治心膈冷氣痰飲胃中悶或吐清水

不納飲食

草豆蔻

一兩去皮

澤瀉

半兩

人參

半兩去蘆頭

桂心

二分

白朮

三分

赤茯苓

半兩

半夏

三兩湯洗七次去滑

陳橘皮

三分湯洗去白穰焙

細辛

半兩

附子

三分炮製

去皮

厚朴

一兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟

甘草

一分炙微

赤判

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚煎至五分去滓不計時候溫服

高良薑散

出聖惠方

治胃膈冷氣痰飲口中清水自出脇

急脹痛不欲飲食此由胃氣虛冷

高良薑

三分

細辛

三分

桂心

三分

桔梗

半兩去蘆

甘草

三分浸七次

訶梨勒皮

一兩

白朮

二分

赤茯苓

三分

半夏

三分湯洗七次去滑

陳橘皮

三分湯浸去白穢焙

厚朴

一兩去麤皮塗生薑汁炙令香熟

人參

半兩去蘆頭

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候溫服

木香散

出聖惠方

治虛冷痰飲氣滯心胸滿脹不下飲食

木香

半兩

赤茯苓

三分

檳榔

半兩

木通

三分

半夏

三分湯洗七遍去滑

枳殼

半兩麩炒微黃去穢

草豆蔻

三分去皮

甘草

一分炙微赤剉

人參

半兩去蘆頭

白朮

三分

陳橘皮

三分湯洗去白穢焙

前胡

三分去蘆頭

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候溫服

一方 治胃膈心腹中痰水冷氣心下汪洋嘈煩或水
鳴多吐口中清水自出脇肋急脹痛不欲食皆胃氣
弱受冷故也其脉喜沉弦細遲

半夏

分五

生薑

分五

芍藥

兩三

茯苓

兩四

細辛

兩二

旋復花

兩二

橘皮

兩二

桂心

兩二

人參

兩二

甘草

兩二

桔梗

兩二

右㕮咀以水一斗煮取三升分三服病先有時喜水

下者用白朮三兩去旋復花若欲得利者加大黃二

兩須微調者用乾薑地黃

溫肺湯

出危氏方

治肺虛久感風邪客寒飲發則喘嗽不

能坐卧嘔吐痰沫不飲食

白芍藥

六兩

五味子

二兩去梗炒

乾薑

二兩

肉桂

二兩去麤皮

半夏

二兩煮熱焙

陳皮

二兩去白

杏仁

二兩

甘草

二兩

細辛

右為麤散每服三大錢水一盞半煎至八分以絹濾

汁食後服兩服滓再煎一服一方去白芍藥細辛二

味可加減用

訶梨勒皮散

出聖惠方

治胸膈冷滯痰飲嘔逆不下飲食四

肢不和

訶梨勒皮

三分

厚朴

一分去麤皮塗生薑汁炙令香熟

人參

三分去蘆

白朮

三分

半夏

三分湯洗七次去滑

桂心

一分

甘草

半兩炙微赤剉

陳橘皮

三分去白穢湯洗焙

乾薑

半兩炮製

判

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗三枚

煎至五分去滓不計時候溫服

半夏散

出聖惠方

治胸中冷痰飲氣滿不欲食

半夏

一兩湯洗七遍去滑

陳橘皮

三分湯洗浸去白穢焙

桂心

一兩

赤茯苓

一兩

人參

三分去蘆頭

細辛

三分

甘草

三分炙微赤判

乾薑

三分炮製判

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分煎至五

分去滓不計時候溫服

丁香茯苓湯

出聖惠方

治脾胃虛冷宿飲留滯以致嘔

吐涎沫或有酸水不思飲食

木香

四兩

丁香

四兩

乾薑

一兩半炮

附子

一兩炮去

皮

半夏

一兩洗七次

肉桂

一兩去皮

陳皮

一兩去白

縮砂

半兩

右㕮咀每服四錢水二盞薑七片棗一枚煎七分不

拘時候服一方有茯苓無肉桂

半夏湯 治冷痰癖飲胃膈痞滿嘔逆不止

白朮

二兩

人參

二兩

赤茯苓

二兩 去黑皮

桂

二兩 去麋皮

甘草

二兩 炙

附子

二兩 炮製 去皮臍

半夏

三兩 湯洗 七遍 切焙

右剉如麻子大每服五錢以水一盞半入生薑半分

切煎取七分去滓溫服食前日三服

半夏湯 治冷痰消食溫胃止逆

半夏

二兩 湯浸去滑焙乾為末薑汁和作麴焙乾

杏仁

二兩 去皮

失雙仁 麴炒研

木香

半兩

桂心

一兩 去麋皮

陳橘皮

一兩

甘草

一兩
炙判

乾薑

三分
炮

右搗篩每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去滓

溫服

前胡散

出聖
惠方

治痰盛腹脇脹滿嘔逆不下食胸中冷

前胡

一兩去
蘆頭

半夏

一兩湯洗
七次去滑

人參

半兩
去蘆

頭

桂心

半兩

乾薑

半兩炮
製判

陳橘皮

一兩

湯浸去
白狼焙

白朮

半兩

右為散每服五錢水一大盞生薑半分棗三枚煎至

五分去滓不拘時候溫服

潔白丸

出和劑方

治膈脘脹滿痰涎不利頭目昏暈吐逆

痰沫

生硫黃

一兩別研

天南星

一兩生用

半夏

一兩生用

盆硝

半兩

玄精石

半兩

附子

一箇六錢重者生去皮臍

右為末入細麴三兩令停勻水和為丸如梧桐子大

每服三十九沸湯內煮令浮漉出生薑湯送下食後

服

華撥散 治胃胸冷痰上焦客熱心下停飲時發醋心

咽喉欲唾乾嘔而渴

華撥

三分

桂

三分去
麤皮

麻仁

三分

高良薑

三分

人參

一兩

白朮

一兩

甘草

半兩
炙剉

乾地黄

一兩

半
炮

厚朴

一兩半去麤
皮生薑汁炙

右為散酒調一錢日再服如要九即煉蜜和九如小

豆大溫酒下二十九

大半夏湯

出千金方

治痰冷癖飲胃膈中不利

半夏

升一

白朮

兩三

生薑

兩八

茯苓

兩三

人參

兩三

桂心

兩三

甘草

兩三

附子

兩三

右八味咬咀以水八升煮取三升分作三服

厚朴九 治冷痰不消胃膈不利解酒食毒

厚朴

八兩去麤皮切用生薑十兩細切同搗細焙乾慢火炒

桂心

五兩去麤

皮

乾薑

四兩炮

蜀椒

二兩去目并閉口者炒出汗

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九溫熟水下治脾胃米飲下中酒吐酒吐逆生薑湯下

人參九 治咯唾冷痰膈腕不利不思飲食

人參

半夏

湯洗去滑

白礬

燒令枯

乾薑

炮製

右等分為末將皂角五挺去皮子按濾去汁煮成膏和上件藥為丸如梧桐子大每服二十九溫水下不拘時候

法製半夏方 治冷痰利胃膈一應諸痰悉治之

半夏

半斤湯洗四十九次用薑汁二升浸一日焙乾

丁香皮

三兩

末

白礬

四兩

草豆蔻

二兩半去皮為末

右同入酒內浸春夏七日秋冬半月候日滿只取半
夏於溫湯內浴過火焙乾不計時候嚼下三五粒用
臘茶下或酒下亦得

小半夏湯 治病心腹虛冷遊痰氣上胃膈不下食或
嘔逆者

半夏

一升

生薑

一斤

桂心

三兩

甘草

一斤

右咬咀以水七升煮取二升半分三服

千金九

出百一選方

治中冷停食不散痰實不入食

硫黃

二兩通明者別研如粉

白茯苓

二兩

乾山藥

二兩

附子

一兩去皮臍生用

半夏

一兩湯洗去滑

青皮

一兩去白

右為細末拌勻湯浸炊餅為丸或用淡麴糊為丸如梧桐子大每服三十九至五十九空心食前服一方治冷痰

桂

胡椒

白芥子

黑芥子

大戟

甘遂

右件等分水糊為丸如梧桐子大每服十九薑湯下

丁香半夏九

一名積柳九
出拔萃方

治心下停飲冷痰頭目昏

暈睡卧口中多涎

檳榔

二分

丁香

一分

半夏

一分

細辛

半兩

乾薑

半兩

人參

右為細末生薑汁煮糊為丸如梧桐子大每服三十丸薑湯下日三服食後

白豆蔻湯 治胃虛氣寒飲食無味嘔逆冷痰噫時聞

食氣

白豆蔻

去皮

攢榔

剉

半夏

為末薑汁和作餅焙乾

右為散每服二錢水一盞生薑三片煎至七分去滓

溫服

溫中化痰九

出和劑方

治證與前一切痰飲類溫中化痰

九同

乾薑

一兩炮

半夏

一兩煮

細辛

半兩去葉洗

胡椒

半兩

白朮

二兩焙

右為末薑汁打糊為丸如梧桐子大每服三十九至

五十九湯飲不拘時候

強中九

一名強中二薑
九出三因方

治胃脘虛寒冷痰留滯痞塞

不通氣不升降口苦無味不思飲食亦主溫脾胃消

寒痰茶積

高良薑

一兩
細判

乾薑

一兩炮
淨拭

陳皮

一兩
去白

青皮

一兩
去穢

半夏

二兩湯
洗去滑

右為末用生薑自然汁煮麴糊為丸如梧桐子大每服二三十丸生薑湯下中滿氣痞服之甚妙一方有

南星半兩炮一方不用生薑汁九鹽湯送下空心服

一法前藥並不炮製

吳茱萸湯 治胃膈冷痰心下煩滿欲吐不下食

吳茱萸

二兩湯洗焙炒

半夏

二兩湯洗七次切焙

桂

二兩去麋皮

人參

二兩

甘草

一兩炙

右咬咀如麻豆大每服五錢以水一盞半入生薑半分切大棗二枚煎取一盞去滓溫服日三

礬石丸 治冷痰溫胃利膈思食

白礬

一兩
枯研

芳藟

一兩

乾薑

一兩
炮

半夏

一兩
碎剉

薑汁浸

透炒

右為細末煮棗肉和丸如梧桐子大每服十五丸至

二十九生薑湯下不拘時候

薑桂丸

出拔
草方

治寒痰咳嗽脉沉面色黧黑小便急痛

足寒而逆心多恐怖

南星

一兩
洗

半夏

一兩
洗

官桂

一兩
去
麋皮

右為細末蒸餅為丸如梧桐子大每服三五丸至

薑湯下食後局方中胡椒理中丸仲景吳茱萸湯亦
可如心下痞悶者加枳實五錢如身熱甚者加黃連五
錢如體重加茯苓白朮各一兩如氣逆上者加苦葶
蘆五錢如氣促者加人參桔梗各五錢如浮腫加郁
李仁杏仁各五錢如大便秘加大黃五錢如痰而能
食者大承氣湯微下之如痰而不能食者厚朴湯主
之一方食後用防已丸或玉粉丸亦可

丁香半夏丸

出王氏
博濟方

治胃冷有痰不思飲食

丁香

一分

白礬

半兩
研

半夏

二兩水浸七日每
日早換水日足取

出切
曝乾

右為細末薑汁和丸如小豆大每服二十九薑湯下

食後一方鹽湯下如膈上有痰涎只服三服墜下立

見効

奇効湯

治冷痰壅盛胃膈不利胃口冷脾氣弱嘔吐

痰涎

木香

半兩

附子

二兩炮製
去皮臍

半夏

二兩
湯浸

七次
切焙

右咬咀剉如麻豆大每服三錢水一盞半生薑半分
切大棗二枚煎至一盞去滓空心溫服

華撥丸 治冷痰飲食不下膈脘不快

華撥

一兩
炒

乾薑

半兩
炮

訶梨勒

三分
去皮

右為細末煮麴糊和丸如桐子大每服二十九薑湯
下不拘時候

治冷痰飲胃膈氣滿吐逆不思飲食宜服此方一名半

夏散

出聖
惠方

半夏

二兩湯洗
七次去滑

乾薑

一兩炮
製剉

丁香

一兩

右為散不計時候以薑湯粥飲調下一錢

倍朮散 治酒癖五飲停水在心下或兩脇胃中膈間

動搖有聲

白朮

二兩

附子

一兩炮
去皮臍

右剉散三服水一大盞生薑十片煎空心服臟腑微動即安一方除附子加乾薑肉桂各一兩為末蜜和

九如桐子大每服二十五丸米湯下食前大効

二生湯

出傳信
通用方

專治寒痰胃冷

附子

生去
皮臍

半夏

生用

右各等分咬咀每服四錢水二盞薑十片煎至七分
去滓溫服空心入少木香煎佳一方去半夏用南星

名附子湯

薑附湯

出千
金方

治痰冷癖氣胃滿短氣嘔沫頭痛飲食

不化

生薑

八兩

附子

四兩生用四破

右二味咬咀以水八升煮取二升分四服又主卒風忌肉冷水等一方附子炮製

一方 治痰涎

右用攪擲為末白湯點一錢服

一方

出聖惠方

治冷痰飲惡心

右用葶撥一兩搗為末於食前清粥飲調半錢服

胡椒理中丸

出衛生家寶方

治脾胃虛寒氣不宣通咳嗽喘急

逆氣虛痞胃膈噎悶腹脇滿痛迫塞短氣不能飲食

嘔吐痰水不止

方見咳嗽門冷嗽類

豆蔻湯

出聖惠方

治痰冷嘔逆胃膈不利飲食不下

草豆蔻

半兩去皮

半夏

半兩湯浸七次去滑焙

陳橘皮

三分

湯浸去

白焙

右搗篩每服三錢水一盞生薑五片煎至七分去滓

溫服不拘時候

吳茱萸湯 治冷痰吞酸吐水胃中不利

吳茱萸

一兩湯洗
七次焙炒

半夏

一兩湯洗
七次焙

附子

一兩炮製
去皮臍

右咬咀如麻豆大每服三錢水一盞半生薑五片煎

至五分去滓溫服不拘時候

鐵刷湯

出衛生
家寶方

治積寒痰飲嘔吐不止胃膈不快不

下飲食

半夏

四錢
洗

草豆蔻

三分

丁香

三分

乾薑

三分
炮

訶子皮

三分

生薑

一兩

右呖咀用水五盞煎至二盞半去滓分三服相繼不拘時候吐不止加附子三錢生薑半兩

薑麴餅子

出十便良方

治冷痰厥

生薑

二斤切作片子以鹽二兩淹一宿焙乾

半夏麴

一兩半

大杏仁

十三

枚

甘草

二兩

丁香

半兩

右搗為末糯米糊丸為小餅子每以白湯嚼下三五餅

白朮散

出保命集方

治夏暑大熱或酒後飲冷痰濕不止胸

不利

白朮

茯苓

半夏

洗

黃芩

各等分

右為麤末每服五錢至七錢水二盞入生薑十片煎至一盞去滓調陳皮末一錢神麴末一錢食後服

法曰大熱大飲葢酒味熱而引飲冷冷與熱凝胃中不能散而成濕故痰作甚者亦吐之吐後服五苓甘露燥濕去痰之劑

順元散

出醫方集成

治氣虛痰盛不得睡卧氣壅痰癥尤

宜服之

南星

一兩
炮

川烏

半兩

附子

半兩

木香

二錢
半

右咬咀每服三錢水一盞薑十片煎熱服

痰癥

方

省風湯

出衛生
家寶方

治痰癥

半夏

八兩

防風

四兩

甘草

二兩

右件同為細末分作四十服每服用水一大盞半薑

二十片煎至七分去滓溫服不計時候一方用天南

星代半夏

導痰湯

治痰厥頭昏暈

出傳信通用方

半夏

四兩湯浸七次

天南星

一兩細切薑汁浸

枳實

一兩去穢

橘紅

一兩

赤茯苓

一兩

右為麤末每服三錢水二盞薑十片煎至一盞去滓

溫服

水玉湯


出楊氏家藏方

治眉稜骨痛不可忍者此痰厥也

半夏

不拘多少湯洗
七次切片子

右咬咀每服三錢水一盞半生薑十片煎至八分去
滓溫服食後



普濟方卷一百六十七

欽定四庫全書

子部
普濟方卷一百六十八

詳校官太醫院醫士臣舒岱

編修臣倉聖脈覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官典簿臣劉景岳

謄錄監生臣鄧捷成

欽定四庫全書

晉濟方卷一百六十八

明

周王朱橚撰

積聚門

總論

夫積有五而聚有六積者生於五臟之陰氣也聚者成於六腑之陽氣也此皆陰陽不和臟腑虛弱風邪搏之所以為積為聚也有如憂思喜怒之氣人之所不能免者過則傷乎五臟逆於四時傳克不行乃留結於五臟是

為五積故在肝曰肥氣在心曰伏梁在脾曰痞氣在肺曰息賁在腎曰賁豚其名不同其症亦異肥氣之狀在左肋下大如覆杯肥大而似有頭足是為肝積診其脉弦而細其色青其病兩脇下痛意引小腹足寒轉筋男子為積疝女人為瘕聚伏梁之狀起於臍下其大如臂上至心下猶梁之橫架於胸膈者是為心積診其脉沉而芤其色赤其病腹熱面赤咽乾心煩甚則吐血令人少食肌瘦痞氣之狀留在胃脘覆大如杯痞塞不通是

為脾積診其脉浮大而長其色黃其病饑則減飽則見
胸滿吐嘔足腫肉削久不愈令人四肢疲軟息賁之狀
在右脇下覆大如杯喘息奔溢是為肺積診其脉浮而
毛其色白其病氣逆胃滿少氣善忘目暄膚寒皮中時
痛或如虱緣或如針刺其脉沉而急其色黑其病饑則
見飽則減小腹裏急腰痛口甘目昏骨冷久不愈令人
骨痿少氣又如六聚之成於六腑則異是矣何者六腑
屬於三陽大陽利清氣陽明泄濁氣少陽化精氣有如

都會之府主轉輸以為常也夫苟六腑失常則邪氣聚而不散始發既無根本上下無所留止其痛亦無常處故在上則格在下則脹傍攻兩脇如有塊易於轉動故非五積之比也凡診其脉駛而緊者積聚也脉浮而牢者積聚也脉橫者脇下有積聚也脉來小沉實者胃中有積聚也大抵病各有證治各有方如診心腹積聚其脉牢強急者生虛弱急者死又諸脉實強者生沉小者死此又不可不察也外臺秘要云肝之積名曰肥氣

在左肋下如覆杯有頭卒久不愈令人發如瘡連歲月
不已以季夏戊巳日得之何以言之肺病傳肝肝當傳
脾脾季夏適王王者不受邪肝欲復還肺肺不肯受故
留結為積故知肝之積以季夏戊巳日得之也心之積
名曰伏梁起臍上大如臂上至心下以秋庚辛日得之
何以言之腎病當傳心心當傳肺肺以秋適王王者不
受邪肺欲復還胃胃不肯受留結為積故知伏梁以秋
庚辛日得之也脾之積名曰痞氣在胃管覆覆如大盤

久不愈令人四肢不收發黃疸飲食不為肌膚以冬壬
癸日得之何以言之肝病當傳脾脾當傳腎腎以冬適
壬王者不受邪脾欲復還肝肝不肯受故留為積故知
痞氣以冬壬癸日得之也肺之積名曰息賁在右脇下
覆覆如大杯久不愈令人滿漸寒熱喘逆發肺癰以春
甲乙日得之何以言之心病傳肺肺當傳肝肝以春適
壬王者不受邪肺欲復還心心不肯受故留結為積故
知息賁以春甲乙日得之也腎之積名曰瘕發於小

腹上至心下若奔豚之狀上下無定久不愈令人呃逆
骨痿少氣以夏丙丁日得之何以言之脾病當傳腎腎
當傳心心以夏適王王者不受邪腎欲復還脾脾不肯
受故結為積故知責豚以夏丙丁日得之也此為五積
診其脉駛而緊積聚脉浮而牢積聚脉橫者脇下有積
聚脉來小沉實者胃中有積聚不下食即吐出脉來細
輒附骨者積也脉出在左積在左脉出在右積在右脉
兩出積在中央以部處之診得肺積脉浮而毛按之辟

易時下氣逆背相引痛少氣善忘目暄皮膚寒秋愈夏
劇主皮中時痛如風緣狀其甚如針刺之狀時痒白色
也診得心積脉沉而花時上下無常處病少腹中熱面
赤咽乾心煩掌熱甚即吐血主身瘰癧主血癰夏差冬
劇色赤也診得脾積脉浮大而長饑則減飽則見復起
與穀爭鬯鬯如桃李起見於外腹滿嘔泄腸鳴四肢重
手足勁寒脇痛引小腹男子得疝也女人病淋也身無
膏澤善腫厥不能卧主肌肉損色黃也診得肝積脉弦

而細兩脇下痛邪走心下足脛轉筋爪甲枯黑春差秋
劇色青也診得腎積脉沉而急苦春與腰相引饑則見
飽則減病腰痛小腹裏急口乾咽腫傷爛目芒脛骨中
寒主髓厥善忘色黑也六腑者大小腸胃膽膀胱三焦
者也屬於三陽大陽利清氣陽明泄濁氣少陽化精氣
如都會之腑主轉輸以為常也六腑失常則壅聚不通
故實而不轉虛而輸隨氣往來痛無定處在上則格在
下則脹傍攻兩脇有如垤塊易於轉變非五臟比也夫

喜傷心者自汗不可疾行不可久立故經曰喜則氣散
怒傷肝者上氣不可忍熱則來盪心短氣絕不得息故
經曰怒則氣擊

一作上

憂傷肺者心系急上焦閉榮衛不

通夜卧不安故經曰憂則氣聚思傷脾者氣留不行積
聚在中脘不得飲食腹脹滿四肢怠惰故經曰思則氣
結悲傷心者善忘不識人置物在處還取不得筋攣四
肢浮腫故經曰悲則氣急恐傷腎者上焦氣閉不行下
焦回還不散猶豫不快嘔逆心惡經曰恐則精却驚傷

膽者神無所歸慮無所定說物不竟而迫故經曰驚則氣亂七者雖不同本乎一氣藏氣不行鬱而生涎隨氣聚積堅大如塊在心腹中或塞咽喉如粉絮吐不出噤不下時去時來每發欲死狀如神靈所作逆害飲食皆氣所生成治之各有方也夫積者傷滯也傷滯之久停留不化則成積矣其于臟腑皆因觸胃以成積病惟脾胃最易受觸盖日用飲酒積或過多停滯難化或吐或嘔或泄或痢當是之時法宜推蕩然後助養脾胃所推

蕩者便宜酌量人之虛實傷滯之輕重而推盪之停滯
一消則不成積剋化失宜久之必成積聚癥瘕矣所謂
積者有積氣積肉積酒積茶積食積痰更有婦女月經
不通遂成血積積者五臟所生氣之所積名曰積其始
發有根本其痛不離其部由陰氣所生也聚者六腑所
成氣之所聚名曰聚其始發無根本其痛無常處由陽
氣所生也然又癥瘕癖結者積聚之異名也證狀不一
原其病本大略相類但從其所得或診其證狀以立名

爾且或隱或見腹內按之形證可驗也瘕者為瘕聚推
之流移不定也癖者僻側在於脇肋結者沉伏結強於
內然有得之於食有得之於氣有得之於憂思有得之
於風寒凡使血氣沉滯留結而為病者治須漸磨潰削
使氣血流通則病可愈矣夫衛氣留於腹中畜積不行
脉強及急腹皮急甚不可刺云黃帝曰衛氣之留於腹
中畜積不行菀蘊不得常所使人肢脇胃中滿喘呼逆
息者何以去之伯高曰其氣積於胸中者上取之積於

腹中者下取之上下皆滿溢者傍取之黃帝曰取之奈何伯高曰積於上者瀉人迎天突於喉中積於下者瀉三里於氣衝上下皆滿者上下取之於季脇之下深一寸重者鷄足取之診視其脉大而弦急及絕不至者及腹皮急甚者當從陰引陽取穴於腹募不可刺也夫不可刺者宜灸也一則沉寒痼冷二則無脉陽之絕也三則腹皮急而陽陷也舍此三者餘皆不得灸若病在兩寸脉者及腹皮急甚者當從陰引陽取穴於腹募五臟

病取五臟募六腑病取六腑募若病在兩尺脉者當從陽引陰取穴於背腧五臟病取五臟腧六腑病取六腑腧元氣病取六腑於募筋骨有形病者取五臟腧募其病不在天之陽不在地之陰在腹中者兩儀之間人事也故取季脇下一寸元氣病取之右筋病取之左故曰在中者傍取之此其理也灸者燔取之儒門事親書論云息城司侯聞父死於賊乃大悲哭之罷便覺心痛日增不已月餘成塊狀若覆杯大痛不住藥皆無功議用

燔鍼炷艾病人惡之乃求於戴人戴人至適巫者在其
傍乃學巫者雜於狂言以誑病者至笑其笑不忍回面
向壁一二日心下結塊皆散戴人曰內經言憂則氣結
喜則百脉舒矣又云喜勝悲內經自皆有法治之不知
何用鍼灸哉一緇侶好茶成病積在左脇戴人曰此與
肥氣頗同然痠瘡不作便非肥氣雖病十年不勞一日
況兩手脉沉細有積故然吾治無鍼灸之苦但畧為施
治可享壽盡期先以茶調散吐出宿茶水數升再以木

如意楠之又涌數升皆作茶色次以三花神祐丸九十餘粒是夜瀉二十餘行膿水相兼燥糞瘀血雜然而下明日以除溫之劑使服十餘日諸苦悉蠲神清色瑩顯慶寺僧應公有沉積數年雖不卧床枕每於四更後心頭悶硬不能安卧須起行寺中習以為常人莫知為何病以藥請於戴人戴人令涌出膠涎一二升如黑礬水繼出黃綠水又下膿血數升自覺胸中如失巨山飲餌無算安眠至曉寄西華縣庠山東顏先生有積二十年

目視物不移細字不觀當心如頑石每發痛不可忍食
減肉消黑黥滿面腰不能直因遇戴人令湧寒痰一盞
如片粉夜以舟車丸通經散下爛腸葵菜汁七八行病
十去三四以熱漿水粥飲之復去痰一大盆次日又以
舟車丸通經散前後約百餘行累無少隱不五六日面
色黥去食進目明心中空曠遂失頑石所在素問曰積
聚留飲痞膈中滿濕積霍亂吐下痼癥堅硬腹滿皆大
陰濕土乃脾胃之氣積聚之根也積者不散聚者不化

留者不行飲者停滯痞者不通隔者阻也中滿下泄為積霍亂吐下為留飲同痼癥者癥微也痼假也斯疾乃五臟六腑陰陽變化興衰之制也亢則害承廼制及則反以謂水得燥則消散而得濕則不消乃為積飲也謂人形精神與榮衛血氣津液出入通流謂夫腠理閉密乃為痞也謂腸胃膈絕傳化失常而為滯也土主形體腹滿於中央乃曰中滿以傳化失度故甚則霍亂吐瀉也癥者腹中堅硬按之應手然水體柔順而今反堅硬

如此者亢則害承廼制也瘕者中遂硬而忽聚忽散無其常故其病未及瘕也經曰血不行而滯故血肉凝而為瘕也小腸移熱於大腸乃為虛瘕大腸移熱於小腸謂兩熱相搏則血溢而為伏瘕血溢不利月事復滯而不行故云為虛瘕為虛與伏同瘕與疝同為傳寫誤也世傳冷病亦有熱或陽氣鬱結怫熱壅滯而堅硬不消者世傳為寒瘕瘕也或堅痞腹滿急痛寒主筋縮故急主痛寒極血凝泣而反蕪土化制之故堅痞而腹滿或

熱鬱於內而腹滿堅結痛不可忍者皆可為寒誤矣何
不以脉症辨之凡諸疾病皆有陰陽寒熱宜以詳之大
抵治積或以所惡者攻之或以所喜者誘之則易愈如
礪砂水銀治肉積神麴麥蘖治酒積水蛭蟲蟲治血積木
香檳榔治氣積牽牛甘遂治水積雄黃膩粉治涎積礞
石巴豆治食積各從其類也若羣隊之藥分其勢則難
取效反損所謂譬猶獵不知兔廣絡原野冀一人獲之
術亦疎矣須是認得分明是積聚然後增減用藥不然

反有所損廣五行記孝微中有僧維則病噎不能食語
弟子曰吾死之後便可開吾胸腹視有何物言絕而卒
弟子果開視胸中得一物形似魚而有兩頭遍體皆肉
鱗弟子置器中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中
藍盛從澱有一僧以澱器中其虫遶逐器中走湏臾化
為水此乃五癥五噎症後人因此藍治噎候矣

積聚

附論

經曰病有積有聚何以別之積者陰氣也聚者陽氣也

陰沉而伏陽浮而動氣之所積名曰積氣之所聚名曰聚故積者五臟所生聚者六腑所生積之為病其始發有常處其痛不離其部上下有所終始左右有所窮處聚之為病其始發無根本上下無所留止其病無常處此積聚之別也

方

秘方三稜煎丸

三稜 陳皮 五靈脂 各三兩 蘿蔔子 白芍藥

栝榔 香附子 草豆 黑牽牛 各二兩 糖毬 四兩

香 枳殼 枳實 縮砂 乾漆 神麴 麥蘖

華澄茄 白朮 片姜 益智 硼砂 草蓂

玄胡 菖蒲 乾姜 烏藥 紅豆 各一兩 蓬朮

二兩 白豆仁 半兩 官桂 一兩

右為細末粉糊為丸桐子大每服五十丸空心溫姜

湯送下

秘傳掌中金丸 真氣衰弱飲酒多傷停於胸膈往往

用感應丸如聖膏理中丸之類又不能克化任意取服轉傷真元臟腑別生他疾惟此藥能消化酒食消痰飲寬中利膈久服永無胸膈不快之疾不動臟腑不損真元加檳榔木香各一兩名檳榔丸又調和氣

陳皮

一斤去白濕稱生薑淨洗與陳皮對下切片如伏中二味晒炒

甘草二兩半夏

三兩湯洗七次姜汁和餅伏中晒炒

神麴

麥蘖

各二兩

砂仁

白豆

菴

各一兩

右為末薑糊丸如桐子大服三四十九薑湯下

效方 主心腹積聚四肢痺癢舉體風殘療百病

虎骨

野葛

各三兩

附子

一十五枚重九斤

甘草

細辛

各一

兩杏仁

巴豆

去皮心

芎藭

切各一升

雄黃

二兩

椒

右以苦酒漬周時猪脂六斤微煎三上三下完取附子一枚視黃為度絞去滓乃內雄黃攪使稠和密器貯之百病皆摩傳上唯不得入即服若服之或如棗大內一合熱酒中湏臾后拔白髮以藥傳之即生烏諸瘡毒風腫及馬鞍瘡等洗即差牛領亦然

破塊丸

一名陰陽丸

治受瘴結成氣塊腹中不能消散服

之即效

出危氏方

華撥

一兩

大黃

一兩一用生

右為細末入生麝香少許煉蜜為丸如梧桐大每服三十丸空心冷水下或冷湯下日三服

紫苑丸

紫苑

去苗細剉淨

茯苓

酒浸

人參

檳榔

茯苓

去皮

官桂

去皮乾姜

白朮

柴胡

去苗土

大黃

炒

黃連

去積

桔梗

當歸

去蘆
淨洗

防風

去蘆

羌活

鱉甲

醋炙去
裙襴

陳皮

白

酒浸

車前子

防已

石菖蒲

熟地黄

酒浸

吳茱萸

湯浸
七次

川烏

炮去
皮臍

川椒

去汗
用殼

巴豆

去皮心
膜油

麥門冬

去心

右各等分為細末煉蜜為丸如桐子大初服快利為

度如不利至七丸酒服或粥飲溫水亦得治疾癖氣

塊及諸黃病毒氣衝心遠臍如蟲咬又治六種水蠱

病寒反胃吐逆飲食不消時行無度婦人月露蘊結

不調或多或少月前月後猶如懷胎又二十四種風

頑晝夜不安夢與鬼交頭生白髮或歌或笑有鬼魅
服此藥皆驗楊駙馬患衝心病每日飲食頻吐徧身
枯瘦每日服此藥五丸至二十日瀉出肉蝦蟆六箇
白膿二升而愈京兆尹趙京先患火風痰眉毛脫落
骨肉瘡疾服此藥一月瀉出癩蟲數十條馬尾長相
似其病即愈河南劉府尹妻患眼不明一年服此藥
二十日瀉出肉鯨六箇肉如針相似眼明如初蔡太
師妻患赤白帶下作氣血崩服五丸至八九丸瀉出

赤水一升內有肉塊下如鷄子大今此藥療一切病

有孕婦人不可服 腸風痔漏溫酒下 赤白痢訶

子湯下 中風甘草湯下 心痛溫酒下 蟲咬心

痛檳榔湯下 隆腸心悶四肢不散溫酒下 氣噎

乾荷葉湯下 轉筋霍亂生姜湯下 一切風疾升

麻湯下 瀉痢黃連湯下 寸白蟲檳榔湯下 喘

嗽杏仁湯下 頭腫熱湯下 打撲傷損溫酒下

腰痛黑豆淋湯下 食積氣塊麵湯下 因酒內傷

酒下 肺氣杏仁湯下 臍下疼芍藥湯下 宿食

不消生姜湯下 陰毒傷寒溫酒下 脾氣陳皮湯

下

金露丸

出和劑方

治腹內積聚癥塊久患大如杯覆及黃瘦

宿水朝暮咳嗽積年冷氣時復腹下盤痛絃結衝心
及兩脇微背連心疼痛氣不息氣遶臍下狀如蟲咬
不可忍十般水氣反胃吐食嘔逆飲食多噎五般痔
漏脚氣走疰風有如蟲行手足煩熱夜卧不安睡語

無度小兒驚疳婦人五邪夢與鬼交沉重不思飲食
昏昏如夢不曉人事欲死懼多或歌或哭不定月候
不調心中如狂身體羸瘦莫辨其狀但服此藥萬不
失一無不平愈是病皆療更不細述

草烏頭炮

黃連

各二兩

桂心

不見火

乾姜

炮

桔梗

吳

茱萸

湯浸七次

茯苓

去皮

柴胡

去苗

乾地黃

洗焙

蜀椒

去目炒

厚

朴姜製

人參

去蘆

菖蒲

酒浸一夕

紫苑

去苗

鱉甲

醋炙

芎藭

洗焙

枳

殼

去核麩炒

貝母

去心

甘遂

炮一方用甘松

甘草

炙

防風

各一兩

巴

豆

去心膜用醋煮二十沸
焙乾取一兩不去油用

右為細末以麵糊為丸如桐子大每服五丸 心中

痰患薑湯 心痛酸石榴皮湯下 口瘡蜜湯下

頭痛石膏湯葱茶下 一切脾胃氣橘皮湯下 傷

寒麻黃蔥湯下 腳氣水氣杏仁湯下 水瀉氣瀉

龍膽草湯下 赤痢甘草湯下 白痢乾姜湯下

赤白痢甘草姜湯下 胸膈咽悶通草湯下 婦人

血氣當歸酒下如不飲酒當歸煎湯亦得 疝氣風

氣小腸氣及下墜附子湯下 常服及應急諸般疾
患凡米飲熱水茶酒任下 如傷冷腹痛酒食所傷
酒疸黃疸氣結痞塞鶴膝風並用鹽酒下 治三十
六腫十二症無不醫治此藥前人用之效者馬遂臨
老渾身楚痛不思飲食每夜五九至七日下午血如鷄
肝者二百餘片臭膿二升以此遂愈三原主簿陳勝
妻有病十五年羸瘦腹中楚痛不可忍服藥至旬日
下青蟲六十四條如筋頭身赤色及藥水五升遂愈

京兆府工曹柳行餘着牀經年服至十日下肉蜣螂
百有餘箇青黃水一升許遂愈王元覽有門客久患
羸瘦吃食轉吐服之下肉蝦蟆七箇青水一升遂愈
興國寺僧澄清患癰塊十五年服十日下肉蛇二條
遂愈後來又患風疾眉毛盡落服至百日出五色蟲
兒出青水三升遂平復此元覽進方時所陳也後代
鄭教授云此方於杜相公府子弟處曾用之無不治
效如與小兒吃時一九分作四九量兒大小可三五

丸合此藥如煮巴豆時須是親自數三十沸便傾出
焙乾若沸過藥即無力服此藥別無所忌只驗定病
症不定用湯有差其效不述也

松烟餅子 治積氣塊消食快氣

細墨

五分
燒研

陳皮

五分
去白

牽牛

五分
錢別研取
頭末五分

神麴

炒

三

稜

火
煨

蜜陀僧

研

五靈脂

研

硼砂

研

牡蠣

火
煨

麥蘖

各五
錢炒

大黃

一兩
北棗

一十四枚
燒存性

班猫

一兩
糯米同炒

乾

漆

炒去
烟

白丁香

研

青礞石

研

錢巴豆

一兩
紙裹燒黃色

為

蓬莪朮

根 一錢

大戟

去

莞花

醋侵 一宿

右為細末水打麵糊為丸如皂角子大捻為餅子記
以所有傷煎湯送下或麵湯亦可小兒三餅大人看
虛實稟氣加四五餅不嚼吞服其積塊漸漸近下再
進一服又覺近下或積塊疝血痢塞大人小兒久痢
或休息痢并男子婦人年深不服水土及暑月變成
惡痢米物不消五塊逆膈胃吐食心胸悶閉酒疸食
黃勞嗽上喘嘔逆涎沫心閉驚恐口苦惡心小便淋

澁大便不通傷寒餘毒婦人胎前產後敗血困生積
成積塊飲食平常遍身疼痛腰強腿硬手足厥九
種心痛十般積熱九般水氣霍亂吐瀉久病瘦弱但
有此症並皆治之一方用陳皮湯下

溫白丸 治臟腑積聚癥癖氣塊腹多疔痛按或有形
肢節煩熱腰脚酸痛及婦人血癖經候不調赤白帶
下等疾

柴胡

去苗

紫苑

去土

吳茱萸

湯浸焙

葛蒲

乾炒

桔梗

剉

妙

荆三稜

煨

赤茯苓

去黑皮

人參

黃連

去積炒

乾姜

炮

桂

去麤皮

蜀椒

去目并合口者炒出汗

巴豆

去皮心膜研出油淨

皂莢

去皮

灰

鱉甲

去裙襴炙各一兩

烏頭

炮製去皮臍

黃芪

剉末各二兩

當歸

二兩切焙

厚朴

去麤皮生薑汁炙二兩

右為末鍊蜜和擣一千下丸如梧桐子大每服三丸加至四五丸溫酒下利下惡物為度

化氣丸 治男子婦人遠年日久茶酒氣食過度成積一切氣候服之如神

官桂 陳皮 青皮 丁香 木香 縮砂

各一兩

三稜

莪朮

各二兩

茯苓

一兩半

人參

好者一兩

香附

半斤

甘

草

厚朴

蘿蔔子

將軍

即大黃各二兩

枳殼

炮

檳榔

各三兩

黑牽牛

四兩頭末

右為末黑牽牛一斤取頭末四兩以三分分之生用

二分炒一分和勻打醋糊須要着鍋方可搜勻丸如

桐子大每服三四十丸姜茶任下仍驗老弱盛衰加

減用之

法製檳榔

治酒食過度胸膈膨滿口吐清水一切積

滯

鷄心檳榔

一兩切
作細塊

白豆蔻

取仁
一兩

鹽

二兩

揀丁香

一作兩
切

塊粉草

一兩切
作細塊

真陳橘皮

半斤去白
切作細條

生姜

半斤切
作細條

右件同河水兩碗浸一宿用慢火砂鍋內煮乾焙乾
入新瓶收每服一撮細嚼飲酒下為細末湯點亦可

傳信適用方

烏頭丸

治男子女人寒冷腹內積聚邪氣往來厥逆

搶心心痛 悶吐下不止 婦人產後羸瘦

烏頭

一十枚

吳茱萸

蜀椒

乾姜

桂心

各二兩半

乾

地黃

一兩半

前胡

細辛

人參

芍藥

白朮

一兩

六錢

皂莢

紫苑

白薇

芍藥

各一兩八錢

右為末蜜丸如梧桐子大酒下十九日三服稍加之

以知為度

丁香丸

出聖惠方

治積聚不消心腹堅脹痰逆嘔噦醋吞

酸脇肋刺痛胸膈痞悶或反胃惡心飲食不下氣上

衝胸痞塞不通及酒癖血癥氣塊時發刺痛全不思食並皆治之常服消飲食行滯氣

猪牙皂角

皂角去皮炙焦黃為細末

好墨

燒醋碎

肉桂

去粗皮

乾姜

炮

丁香

木香

各一兩

川大黃

別為細末

乾漆

碎炒令烟盡為細末

黑牽牛

炒為細末

蓬莪茂

炮搗碎各二兩

青皮

去白三兩

京三稜

炮

碎

硼砂

別碎

附子

炮去皮臍各二兩

巴豆

一錢五分先用醋煎硼砂令熱下巴

豆霜煎三兩沸下大黃末熬膏

右以大黃硼砂巴豆膏和丸如菜豆大每服一兩丸

茶酒任下如要取化癥瘕癖塊用生姜湯下七丸並食後臨卧服之

流氣丸

出御藥院方

治五積六聚癥瘕癖塊留飲以上此積

皆係寒氣客搏於腸胃之間久而停留不去變成諸疾此藥能消導滯氣通和陰陽消舊飲雖年高氣弱皆可服之

木香

川茴香

微炒

菖蒲

青皮

去穢炒

蓬莪茂

炮剉

紅橘

皮

去穢

檳榔

蘿蔔子

補骨脂

微炒

華澄茄

縮砂

仁

神麴

微炒

麥蘖

微炒

枳殼

去穰以上各一兩

牽牛

右為細末麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸食後

細嚼白豆蔻一枚白湯送下

經金丹

出奉事方

治五種氣積及五噎胸膈不快傍痰宿飲

丁香

木香

沉香

檳榔

官桂

胡椒

礪

砂

研

白丁香

各一分

肉豆蔻

飛礪

各一分

馬兜鈴

炒

南星

五靈脂

瓜蒌

根

半夏

各兩半

硃砂

三分留半為衣

右為細末入二味研藥和勻生姜汁煮糊為丸如梧

桐子大服三九生姜湯下或乾嚼蘿蔔下

和中丸 治脾氣益腎水消腸胃中積滯調三焦氣開
胸膈痞滿上攻心腹悶痛筋脉拘急肢體悶倦潤大
便清小便進美飲食

木香 沉香 白豆蔻 砂仁 檳榔 枳實

去穢

蓬朮

去皮

當歸

酒浸

木通

去皮

黃芩

去腐

黃連

以上各

一兩

大黃

四兩 郁李仁

一兩

猪牙皂角

五錢

右為末滴水為丸梧桐子大每服一百食後茶清送

下

荆三棱煎丸

出王氏博濟方

治五積六聚血氣塊聚散不定及

一切氣積不和

荆三棱

煨剉

蓬莪朮

煨剉

芫花

醋炒焦

半夏

湯洗七遍焙

青橘

皮

去白炒各一兩

硼砂

去石研

附子

炮製去皮臍

桂

去粗皮

延胡索

醋炒

大戟

臘粉調酒炙

乾漆

炒烟出

猪牙皂莢

去皮炙

五靈脂

去砂石

淨炒

右為末用好醋三升入藥二停熬成膏再入一停和

丸如菜豆大每服五丸食後生姜湯下

散聚湯

出三因湯

治久氣積聚狀如癥瘕隨氣以上下有時

心腹絞痛攻刺腰脇上氣窒塞喘咳滿悶小腹膨脹
小大便不利或腹泄瀉淋漓無度遺精白濁狀若虛
勞

半夏

湯洗七次

檳榔

當歸

各三分

橘皮

杏仁

雙炒去皮尖

桂心

各二兩

茯苓

甘草

炙

附子

炮去皮臍

川芎

枳殼

雙炒去穢

厚朴

姜汁製

吳茱萸

湯洗各一兩

右為剉散每服四錢水一盞半煎七分去滓食前服

大便不利加大黃

木香檳榔丸

出瑞仿
堂方

木香

檳榔

黃連

去

當歸

枳殼

去穢
火煨

青皮

去穢

陳皮

去白各
一兩

大黃

三兩紙裹
酒浸濕

黃芩

一兩去
黑心

黃蘗

三兩

去粗
皮

牽牛

四兩取頭
末二兩

香附子

四兩炒
去毛

廣茂

一兩火
煨去穢

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服五七十丸食

後姜湯送下

呵子丸

出本
事方

治伏積注氣發則喘悶

呵子

白茯苓

桃仁

枳殼

桂心

檳榔

桔梗

白芍藥

鱉甲

川芎

川烏

橘紅

以上

各等
分人參

右為細末鍊蜜杵丸如梧桐子大酒下二十九丸熱水
亦得

枳殼散

出本
事方

治五種積氣三焦痞塞胸膈滿悶臂引疼

心腹膨脹脇肋懶疼食飲不下噎塞不通嘔吐痰逆

口苦吞酸羸瘦少力短氣常服順氣寬中消痞癖積
聚散驚憂主心氣宜服

枳殼 荆三稜 橘皮 益智仁 蓬莪朮 檳

榔 肉桂 各一兩 乾姜 甘草 青皮 肉豆蔻

木香 各半兩 厚朴

右為細末每二錢水一盞生薑三片棗一枚同煎至
七分熱服鹽亦得不拘時候一方用白豆蔻無肉豆
蔻

盧氏異方感應丸

出和劑方

與和劑方大不同但修製必須

如法分兩最要停勻只是煖化不可偏勝此藥消積滯不動臟腑其功用妙處在用蠟之多切不可少常服建脾進食永無寒熱瀉痢之疾蓋消磨積滯以漸自然無疾遇酒食醉飽尤宜多服神效不可述

黃蠟

真者十兩

乳香

丁香

木香

不見火

巴豆

百粒去皮研為

粉用紙數層裹透再易紙至油盡成白霜為妙

杏仁

七十箇去皮尖研細依巴豆一法去

油

乾姜

肉豆蔻

麵裹

華澄茄

檳榔

百草霜

歸 片子姜黃 各一
兩

右除巴豆粉百草霜杏仁乳香外餘並為細末却同
前四味拌和均勻先將上項黃蠟十兩於銀器內鎔
化作汁重綿濾去滓以無灰老酒一升於銀器內煮
蠟鎔數沸候冷其蠟自浮於酒上去酒不用春夏修
可用清麻油一兩秋冬用油一兩半於大銀器內熬
冷香熟次下酒煮蠟同化作汁乘熱拌和前項末藥
十分均勻候稍凝分作劑子用罐子盛之半月後方

可服任意服之二三十九加至五十九無碍此藥以
蠟多雖難丸然九子愈細其功愈博臨睡須常服之
若欲治病不拘時候如服旋丸如蘿蔔子大治豆疾
香蘇散三錢水一盞煎服加白芥子一撮炒研入用
消積丸

出聖濟
總錄

治積滯寬利膈腕思飲食

牽子

半兩一
半取末

青橘皮

一兩去
白焙

丁香

木香

礪砂

研

沉香

剉各
一兩

檳榔

二枚
剉

桂

去粗
皮

乾姜

炮半
兩

右為末煉蜜為丸如豌豆大每服一九至三丸食後

服臨卧橘皮湯下

木香丸

出聖濟
總錄

治五種積聚成塊

木香

訶黎勒

炮用皮

人參

檳榔

剉

大黃

剉炒

郁李

仁

生研各
三兩

赤茯苓

去黑皮

枳殼

去瓢
麤炒

芍藥

硝石

碎

紫蘇

微炒

乾薑

炮各
二兩

右為末煉蜜為丸如桐子大每服空心溫酒下三十

丸至四十丸通利則減丸數

礪砂丸

出衛生
家寶

治一切積聚有飲心痛氣塊食積面黃

肌瘦

礪砂

荊三稜

用末

乾薑

香

白芷

巴豆

去油

各半兩

大黃

別末

乾漆

各一兩

木香

青皮

胡椒

各一分

檳榔

肉豆蔻

各一兩

右為細末用鹹醋二升煎巴豆五六七沸後下三稜

大黃末同煎五七沸入礪砂同煎成稀膏便入諸藥

和勻丸棗豆大年深氣塊生姜湯下四五丸食積熱

水下白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下血痢用當歸葱

酒亦可

硃砂守病丸

一名太上老君守病丸

硃砂

三錢

鵬砂

一錢

心紅

三錢

粉霜

一錢

輕粉

一錢

龍骨

一錢

白

膠香

一兩半

琥珀

一錢

硼砂

一錢

雄黃

一錢

石腦油

二錢

千口

吐

不入藥水中浸用

右將鵬砂硼砂雄黃各乳研却用石腦油銷銀大沙
鍋內將上三味乳細末和勻用一匙子不住手攪沙
鍋外用一大鍋滾湯將沙鍋頓放湯鍋中煮仍不住

手攪至油砂雄黃乾黑色成膏為度却取去沙鍋候
冷定乾硬再入乳鉢細研却入餘藥末同研勻用大
銅匙將藥末入熱湯內盪自然成劑用手捏成塊就
於湯火處旋捏下丸如櫻桃大隨丸即放入千口吐
水碗內浸之候冷定硬出底乾收貯服之用新水送
下未時前後服次日服五積丸一方無龍骨白膠香
粉霜用赤石脂

五積丸

巴豆

麴麩燒去殼
取肉一兩

黃柏末

五錢

使君子肉

五錢

蛤粉

五錢

苦楝根末

五錢

雷丸

五錢

右為末和勻滴水為丸如桐子大每服一十五丸煎

使君子肉湯下

固腸散

白朮

滑石

甘草

寒水石

煨

牡丹皮

人參

白茯苓

萊豆粉

五錢

右為末空心米飲調下二錢病虛者三服忌生冷硬

物半月

枳脾丸

南星

兩四

半夏

兩二

舶上硫黃

兩二

輕粉

錢三

錫膠

錢三

雷丸

一兩乾胭脂

錢五

白牽牛

一兩

炒

右為末酒糊為丸如小豆大每服三十丸生薑湯下

日進二服

快活丸

消酒食去積滯散冷氣

枳殼

青皮

陳皮

丁香

砂仁

烏藥

各兩

三棱 蓬朮 香附 蘿蔔子 栗楔 麥芽

各三

兩

右糊丸桐子大服三五十九茶酒任下

礪砂煎丸

出聖惠方

治積聚氣久不消散腹脇脹痛面無顏

色四肢不和

礪砂

二兩不夾石者細研醋一升半與花末同熬如膏

芫花

一兩炒令黃色搗羅為末

川烏頭

半兩炮製去皮臍

川大黃

一兩剉碎微炒

木香

五錢當歸五錢

鱉甲

一兩塗上醋黃令去裙爛

桂心

半兩

蓬莪茂

半兩

荊三棱

半兩

炮乾漆三分搗碎 青橘皮三分湯浸
剉妙令烟出 去白瓤焙

右為細末同煎更入小蒸餅和搗三百杵丸如桐子
大每服十五丸食前溫酒下

檳榔湯出聖濟方 治積聚結實腹滿刺痛泄痢不止方見諸

氣類

透膜丸出聖濟總錄 取積聚

礞砂一錢 乳香一錢 粉霜一錢 硝石一錢 礞石各一分二味
同研勻細鎔

作汁用皂角子三枚放入烟絕
為度候冷研每料用末三錢 硫黃 膩粉 白

丁香

蜜陀僧

荆三稜末

各一錢

巴豆

二十粒去皮心膜醋

煮紫色研

右為末研勻用棗肉丸如菉豆大每服七丸至十九

煎生姜橘皮湯下小兒皂角子湯下

麝香寬中丸

出問易方

理中脘不快胸膈痞悶嘔吐惡心腹

脇刺痛飲食不思

麝香

二錢別研

沉香

四錢細剉

木香

五錢

甘草

一兩炙

白檀香

一兩

別研末

甘松

去土

陳皮

去白

姜黃

各二兩

香附子

一兩炒去毛

硫磺

砂仁

一兩五錢

右為末次入麝香研和熬甘草膏為丸桐子大每服

三十丸細嚼沸湯下不拘時候

恒山丸

出千金方

治脇下邪氣積聚寒熱往來如溫瘧

恒山 蜀漆 白薇 桂心 鮑甲 附子 白

朮 鱉甲

鹿蟲

貝齒

各一兩

蜚蠊

六銖

右為末蜜丸如梧桐子大以米泔清服五丸日三服

三稜煎丸

三稜

八兩

杏仁

蘿蔔子

大礪砂

各一兩五錢

神麴

麥蘖

青皮

乾漆

各二兩

縮砂

丁香

蓬朮

各一兩

兩五錢

右為細末薄糊丸如梧桐子大每服二三十丸飲湯

下

巴豆

去皮心膜研出油一兩

丁香

三錢

烏梅

去核一兩半

乾漆

搗碎炒烟

出一兩
滑石 一錢

右先搗羅四味為末然後入巴豆同研勻用粳米飯

同擣爛丸如粟米大每服二丸至三丸隨所傷物下
更量虛實加減

太乙神明再造感應丹

出危氏方

治因虛滯冷內積陰寒形

羸氣弱因虛有傷停積胃脘不能傳化或因氣傷冷
失饑寒飽餐過多嘔吐不止心痛腹脹疼不可忍或
大便頻併或久痢赤白或霍亂吐瀉又治中酒嘔噦
心胸痞悶不思飲食又治久病荏苒歲月漸至虛弱
羸瘦飲食遲化大便或閉或瀉不拘久新積冷氣病

並皆治之不過三服便見痊愈此藥性溫無毒不損
胃氣只磨化濕冷積聚治氣旋丸如菴豆大每服三
五九量虛實加減溫湯下不拘時候常服進食消酒
毒令人不中酒又治小兒脾胃虛弱累有傷滯每服
委米大五粒乾薑湯下不拘時候治病有神效此藥
近世盛行有數方唯此方乃太乙神明再造功效神
異

肉豆蔻仁

二兩

荊三稜

一兩

剉

揀丁香

一兩

華澄茄

一兩

川

麵薑

二兩
炒

木香

一兩

百草霜

二兩

黃蠟

四兩
一作酒蠟

巴豆

一百

粒去皮
研取霜

杏仁

一百粒去
皮尖另研

清油

一兩

右先將肉豆蔻荆三稜丁香萆澄茄川麵姜木香百草霜一處為細末同巴豆杏仁霜一處拌勻先下油熱次蠟熬鎔傾在藥末內和成劑旋丸如菜豆大每服三五丸熱水下食後臨卧服小兒如黍米大二三丸乾薑湯下傷滯糞白有效

五積散

治五積六聚并酒積蠱氣所傷

石榴皮 荆三稜 巴豆 五靈脂 大戟 芫

花 甘遂 甜葶藶 杏仁 大黃 烏梅 鹽

豉

各等
兩分

以上一十二味頭醋三碗煮盡乾於沙鍋內炒黃色
加陳皮青皮木香瞿麥豆蔻砂仁六味在內一處相
和研為細末每服一錢空心溫酒調下病重二錢如
為丸以醋打糊為丸如菜豆大每服一十五丸至三
十丸 傷酒葛根湯下 傷食鹽湯下 氣蠱木香

湯下 水蠱樟柳根湯下

順逆丸 主久寒積聚氣逆不能食

大黃錢一 黃芩 厚朴炙 乾地黄 桂心 滑石

杏子去皮
尖熬 黃連 麥門冬去心
各四分

右搗合下篩以蜜和丸如桐子大每服十丸日再服
後食不加稍增之以加為度忌蕪荑生蔥猪頭肉

黃藥針砂丸

針砂 青皮 陳皮 乾漆 黑牽牛 白礬

青礬

綠礬

各四兩

蒼朮

半斤米泔浸一兩

右除蒼朮半斤餘四兩用米醋兩碗將三礬共針砂煮令醋乾共為末醋糊為丸如桐子大每服三十九

一日一服

積氣丸

出聖濟總錄

治一切積滯痰逆惡心霍亂吐瀉膈氣

痞滿脇肋積塊胸膈膨悶嘔噦心痰泄痢不止

代赭石

煨醋研

礞石

研各一兩

桂

去粗皮

赤茯苓

去黑皮

礪砂

去黑皮

礪砂

研

青橘皮

去白焙各半兩

胡椒

四十粒

巴豆

去皮心膜研四錢

右搗羅四味為末與四味研者和勻酒煮面糊丸如
梧桐子大每服一九至三丸食後木香湯下

三稜煎丸

出和劑方

治積順氣寬中消積滯化痰飲治中脘

氣痞心腹堅脹脇下緊硬胸中痞塞喘滿短氣暗心
氣不通嘔吐痰逆飲食不下大便不調或瀉或秘

杏仁

湯浸去皮尖麤炒黃色

硼砂

飛研一兩

神麴

碎炒

麥蘖

炒各三兩

青

皮去

白乾漆

炒

蘿蔔子

微炒各二兩

三稜

生細剉搗為末八兩以酒三升

石器內
熬成膏

右為末以三稜膏勻搜和丸如桐子大每服十五丸至二十九溫米湯飲下食後服加阿魏丸姜湯下

蓬莪茂丹

出御藥院方

治久患癖瘕積聚心腹症悶飲食減

少四肢困倦欲成勞瘵常服調和榮衛美進飲食消積聚長肌肉

蓬莪茂

荆三稜

木香

白芍藥

鱉甲

各五錢

白朮

人參

各一兩

當歸

二錢五分

右為細末用浸蒸餅為丸如豌豆大每服三十丸食

後溫粥飲下

握藥宣疾

巴豆 乾薑 韭子 良薑 硫黃 甘遂 白

檳榔

各等分

右為末研飯為丸如中指頭大用時早朝用椒湯浸
手了麻油塗手掌中握藥一丸移時便瀉欲得瀉止
即以冷水洗手男左女右手心握本事方有肉桂附
子

生薑橘皮丸

出楊氏家藏方

升降滯氣消飲去痰溫中散寒美

進飲食

陳橘皮

一斤 生薑

一斤

神麴

二兩

右為細末麵糊和丸如梧桐子大每服五七十九米
飲熱水下食後無問老幼皆可服

七香丸

通中快氣

丁香

檀香

益智仁

甘草

各一兩

木香

蓬莖

木

一兩五錢

香附子

一兩五錢

右七味甘草膏九如鷄頭子大服時薑湯嚼下兩三粒治一切結實衝胸膈惡氣用水薑汁煎服治積聚痰飲不下飲食嘔逆及腹內諸疾宣一切宿滯以續隨子研碎酒服之不過三顆當下惡物又單方日服十粒瀉多以酸漿水薄醋粥吃即止治身熱腹中積聚邪氣痞悶中如火燒煩滿以凝水石研水飲之治胸膈中積食以醋水飲之下氣止渴用溫葶臨卧嗽三枚而寢生熱皆宜

取積妙應丸 家傳經驗專取男子女人小兒諸般積
滯氣多因茶酒生菓肉麪所傷又為悲憂喜怒之氣
鬱結心懷積成癖痺癥瘕大如杯碗不消諸種蟲積
及治黃疸水蠱徧身浮腫翻胃吐食九種心痛一切
風症婦人血瘕淋帶經脉不通腹內如懷胎孕及成
鬼胎小兒脾疳積滯並皆治之此藥不動元陽真氣
服後肚腹平復亦不疼痛雖年幼氣弱小兒加減服
有利無害

檳榔

斤一

大黃

斤一

牽牛末

斤二

貫衆

斤半

蕪荑仁

斤半

另研

雷

九

斤半

鶴虱

兩四

錫灰

兩四

阿魏

兩二

酒化

開揉

右為細末用皂角去皮弦子淨一斤半熱水泡浸搓

橘水汁濾去滓與藥末皂角水再入糊為丸如桐子

大每服稱四錢重作一服五更用葱白七根熬湯送

下仍以棗兒三箇食之壓藥次早天明後臟腑一行

後取下惡積之物如有積者盡去數行如止見稀水

無積物即用溫薄米粥補住

治諸般積滯神效

沉香

錢一

木香

分五

雷丸

錢二

青皮

分五

京三稜

錢一

黑牽牛

頭末一錢五分

石三稜

錢一

縮砂

分五

蓬莪朮

錢一

檳榔

分五

白牽

牛

頭末一錢

右為細末先將水一大碗隔宿滾五七沸露出一宿空心每服四錢調服如多時不動再服二錢行五七遍不止用白米湯補之小兒服二錢婦人加琥珀如吃藥後忌諸般生冷物油醬醋三日用白粥

妙香丸

出聖濟總錄

治積聚留滯胸膈痞悶嘔噦吐逆心腹

刺痛脇肋脹滿噫氣吞酸宿食不消瘰癧結塊四肢

倦怠不思飲食

檳榔

一錢剉

桂

去粗皮

丹砂

研

麝香

五分研

桃仁

去皮尖雙仁炒

各半巴豆

二十五粒去皮心膜研出油

附子

炮製去皮

附子

一兩

右為末溫浸炊餅和丸如桐子大每服一九食後溫

木香湯下或生薑湯下更量虛實加減

積氣丸

出聖濟總錄

治一切積滯痰逆惡心吐瀉霍亂膈氣

痞滿脇肋積塊胸膈膨悶嘔噦心疼泄瀉下痢

大戟

龍膽

木香

各半兩

杏仁

去皮尖雙仁炒研

代赭

煅醋

淬

赤石脂

水飛研各一兩

巴豆

去皮心膜研

右研極細以麴糊為丸如桐子大陰乾經十日方可服每三丸至五丸木香湯下溫湯熱水亦可

感應丸

出衛生家寶

治虛中積冷氣若有傷停積胃脘不能

傳化或因氣傷冷因飢飽食醉酒過多心下堅冷兩脇脹痛心腹大疼霍亂吐瀉大便頻數併後遲滯久

痢赤白膿血相雜米穀不消愈而復發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜睡頭旋胸膈痞悶四肢倦怠不欲飲食又治妊娠傷冷新產有傷日久有積寒吃熱藥不效者又治久病形羸荏苒歲日漸致虛弱面黃肌瘦飲食或進或退大便或秘或澀不拘久新積冷並悉治之大病不過三服便見全愈此藥溫無毒並不燥熱損胃氣亦不吐泄祇是磨化積聚消逐濕冷療飲食所傷快三焦滯氣旋丸如菴豆大每服三五粒量

虛實加減溫水吞下不拘時候服進飲食消酒毒令
人不中酒又治小兒脾胃虛弱累有傷滯糞白鮓臭
下痢水穀每服五粒黍米大乾薑湯下不拘時候

百草霜

用村庄家鍋上底刮者細研二兩

南木香

去蘆頭二兩半

杏仁

肥者

去雙仁者一百四十枚
去皮尖湯浸一宿別研

丁香

肉豆蔻

去麤皮

巴豆

七十枚去皮心膜
研細出盡油如粉

川甘薑

炮製一兩

右除巴豆粉百草霜杏仁三味外餘四味擣為細末
與三味同拌研令細用好蠟置和先將蠟六兩鎔化

作汁以重綿濾去滓以好酒一斤於銀器內煮蠟鎔數沸傾出候酒冷其蠟自浮取蠟稱用凡春夏修合用清油一兩於鍋內熬令末散香熟次下酒煮蠟四兩同化作汁就鍋內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油一兩半同前煮熟作汁和匱藥末成劑分作小錠子以油單紙裹旋丸服餌此高殿前家方也若腹痛疼不可忍者當服此藥以大便通利為效或未通更宜倍加丸數雖多服無害以利為期若利後腹

大不調或泄瀉不止或愈見絞痛當以家菖蒲煎湯
解之却於咬咀方中選藥調理自能平復或者見服
藥之後痛或愈甚既流利而痛未除便謂前藥之訛
殊不知乃陰陽擾亂臟氣未平久當自定治赤白痢
臍腹疼痛者多由腸胃間積滯所致先以此藥微利
兼治男子瘰癧疝氣膀胱賁豚腎氣脚氣攻刺亦用
此藥微微疏利酒積食積痰飲為患婦人血氣並宜
服之本是高家真方丁香木香止用半兩宮方加青

木香 華澄茄 枳殼 三稜 薑黃 檳榔 白豆蔻

積聚湯

一名大
功氣湯

治積氣或一邊或左右或不循行上下

或肌肉之間如錐刀所剉其氣不得見令人腹中痛
滿由驚憂患怒或胃寒熱留而不去為伏鬱之氣因
氣流行隨經上下相搏而痛久令人痞悶其脉短澀
胃之聚氣狀如癥瘕攻刺腰脇上氣滯塞小腹脹
大小便不利或泄瀉淋瀝無度

三稜

莪朮

青皮

去白

陳皮

去白

桂心

不見火

藿香

葉

桔梗

去蘆
剉炒

益智仁

香附子

各一兩
五錢

甘草

三錢
炙

右咬咀每服五六錢水二盞煎至一盞去粗溫服食

前

捶鑿丸

療腹中積聚邪氣寒熱消穀

甘遂

芫花

芫花

桂心

巴豆

杏仁


桔

梗

各一
錢

右芫花一味熬令香巴豆杏仁去皮熬令變色赤各藥擣下細篩擣合和以白蜜擣萬杵丸如小豆大一

丸日三行常將服之傷寒增服膈上吐膈下利小兒
亦服婦人魚身亦服名曰捶鑿以消積滯忌猪肉蘆
筍生葱



普濟方卷一百六十八